Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pillar of the Kingdom

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒนธรรม ของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย

ศยามล เจริญรัตน์

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทสารเสพติด

- ประเภทฝิ่น หรือมอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เพทินดีน เป็นต้น
- ประเภทบาร์บิทูเรตรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ในทำนองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์บิทาล อะโมบาร์บิทาล พาราดีไฮด์ ไดอะซีแพม เมโปรบาเมต คลอไดอะซิป๊อกไซด์ เป็นต้น
- ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ เป็นต้น
- ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เด็กซ์แอมเฟตามีน ไอซ์ เป็นต้น
- ประเภทโคเคน เช่น ใบโคคา เป็นต้น
- ประเภทกัญชา เช่น ยอดช่อดอกกัญชาตัวเมีย เป็นต้น
- ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม เป็นต้น
- ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลดี ดีเอ็มที ลำโพง สารระเหย เห็ดเมา
- ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหรี่ เป็นต้น (พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. 2545)

ยาเสพติด

- **องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)**
- **องค์การสหประชาชาติ**
- **พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528** มาตรา 4 ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น <u>ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ</u> มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และ<u>สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง</u> กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา <u>แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจำบ้าน บางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่</u>

ยาบ้า
570,000 เม็ด
เฮโรอีน
9.45 กก.
เฮโรอีน
26.4 กก.

ประเภทของยาเสพติดใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ประเภทที่1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง -ยาที่ไม่มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ และทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรง เช่น <u>เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี</u>

ประเภทที่2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป- มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมาก และทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวัง เช่น <u>มอร์ฟีน โคเคน โคเดอีน</u>

ประเภทที่3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษในประเภท2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย- ขึ้นทะเบียนตำรับไว้ เป็นยาที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อย แต่ยังคงมีอันตราย และมีประโยชน์มากในการรักษาโรคเช่น <u>ยาแก้ไอผสมโคเดอีน</u>

ประเภทที่4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท1 หรือประเภท2 - เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)

ประเภทที่5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่1 ถึงประเภทที่4 ส่วนมากเป็นพืชเสพติด - เช่น <u>กัญชา พืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย</u>

สถานการณ์การค้ายาเสพติด

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.



ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.











ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.











พื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด



ภาค	จังหวัด
กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
กลาง	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี ชลบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ หนองคาย
เหนือ	เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก
ใต้	ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา



จังหวัด	อำเภอ	จังหวัด	อำเภอ
เชียงราย	อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.เทิง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.แม่สราย	อุบลราชธานี	อ.เขมราฐ
เชียงใหม่	อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.แม่อาย อ.เวียงแหง	นครพนม	อ.เมืองนครพนม อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม อ.บ้านแพง
แม่ฮ่องสอน	อ.แม่ลาน้อย	บึงกาฬ	อ.บึงโขงหลง อ.บุ่งคล้า อ.เมืองบึงกาฬ
ตาก	อ.แม่สอด	เลย	อ.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่ อ.ปากชม
สระแก้ว	อ.อรัญประเทศ	หนองคาย	อ.เมืองหนองคาย
กาญจนบุรี	อ.สังขละบุรี	สระแก้ว	อ.อรัญประเทศ
สมุทรปราการ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	กาญจนบุรี	อ.สังขละบุรี
กรุงเทพมหานคร	ท่าอากาศยานดอนเมือง	ภูเก็ต	ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต(อ.ถลาง)

"กลุ่มการค้าในเรือนจำยังคงมีบทบาทสำคัญในการบงการการค้ายาเสพติด"

"กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีรูปแบบวิธีการค้ายาเสพติดและการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่หลากหลายมากขึ้น"

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.



สัดส่วนผู้เข้าบำบัดทั้งหมด แยกตามอายุ



ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.

สัดส่วนผู้เข้าบำบัด แยกตามชนิดยาเสพติด

ยาบ้ามากที่สุด ต่อเนื่อง

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.



งานวิจัย(องค์ความรู้)ที่ผ่านมา

- สถานการณ์ยาเสพติด-การปราบปราม
- ตัวยาเฉพาะ ไอซ์ /กัญชา/ ยาบ้า
- กลุ่มประชากรเฉพาะ วัยรุ่นในสถานพินิจ/ แรงงานประเภทต่างๆ
- การป้องกัน
- การบำบัด และฟื้นฟู
- การประเมินผลต่างๆ
- การบริหารจัดการ และอื่นๆ

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒนธรรม

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด

- ยาเสพติดคืออะไร
- ใครเกี่ยวข้อง
- เกิดจากอะไร
- บำบัดฟื้นฟูอย่างไร / ใครบำบัด
- หลังบำบัด

มิติสังคมวัฒนธรรม ความเสี่ยง

- กระแสโลก
- สังคม
- ชุมชน
- ครอบครัว/ เพื่อน- กลุ่ม/คนรอบตัว
- ตนเอง

ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อุปทาน

- ผู้ผลิต
- ผู้ค้า/ขนส่ง

อุปสงค์

- ผู้เสพประเภทต่างๆ ตามอาชีพ กลุ่มประชากร และอายุ

เหตุของการใช้ยาเสพติด

- เพื่อการรักษา อาการทางกายและจิต รวมถึงการถอนยาบางชนิด - อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อการทำงาน/ประกอบอาชีพ แรงงาน หญิง-ชายบริการ ผู้ทำงานอยู่ในภาคบริการในยามค่ำคืน เพื่อให้ทำงานได้นาน กล้าแสดงออก และเอาใจลูกค้า
- เพื่อความสนุกสนาน บันเทิง
- เพื่อความสวยงาม – ลดน้ำหนัก
- ความเชื่อผิดๆ –เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ /ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
- ติดจากฤทธิ์ตัวยา -สารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เช่น เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เฮโรอีน เป็นต้น เมื่อผู้เสพเริ่มทดลองใช้และได้รับฤทธิ์ของยาเสพติดแล้วพึงพอใจก็จะเสพซ้ำจนเกิดการติดยา

วัยรุ่นกับการใช้ยาเสพติด: มิติวัฒนธรรมและสังคมที่เสี่ยง ๑

A: ยาโปรโคดิล (procodyl) และ ยาทรามาดอล (tramadol)

- ยา ‘โปร’ (procodyl) เป็นยาแก้แพ้ชนิดน้ำสำหรับเด็ก
- ผสม น้ำอัดลม (อาจมียาแก้ปวดชนิดเม็ดด้วย) โปร ขวด ยาแก้ปวด สิบเม็ด ชุดละ ร้อยสามสิบถึงสองร้อยบาท

- ทรามาดอลใช้เป็น ยาบรรเทาปวด
- ผสมน้ำอัดลม



September 21, 2013 · Like Page

LEAN คืออะไร // ตอบ LEAN <ลิ้น>LEAN คืออะไร
ตอบ LEAN คือเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นเหมือนยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของสารเสพติดครับ ส่วนผสมหลักของมันคือยาแก้ไออย่างแรงที่มีส่วนผสมของCodeineซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากฝิ่นและมอร์ฟีน โดยเวลาดื่มนิยมผสมกับพวกsprite,Mountain Dew เป็นต้น ซึ่งจากส่วนผสมแล้วจึงทำให้มันมมีลักษณะเป็นสารเสพติด อาการเมื่อดื่มเข้าไปก็จะเหมือนกับตัวเบา ไม่รู้สึกเจ็บปวด ซึ่งก็คืออาการจากมอร์ฟีนนั่นเอง 😃 Credit. potetelogy

วิธีผสมLEAN แบบจริงๆๆๆ คือ
อุปกรณ์
1.โปรโคลดิ้ว
2.ทรามาดอล
3.ยาแก้ไอ(ไทแร็บ/ทาแร็กซีน/ไดมีแทป อไลก์ได้)
4.สไปรท์
5.น้ำองุ่น วิธีทำ บางคงสงสัย โปรโคลดิ้วคือไร ง่ายๆวิธีทำมันคือ แกะแคปซุลในทรามาดอลมา 10เม็ด แล้วเอาผงของมันใส่ลงในยาแก้ไอ เขย่าๆๆๆ ได้ละโปร มาถึงวิธีทำLEAN เอาสไปรท์ใส่เหยือก น้ำองุ่นใส่เหยือก เทโปรลงไปตามความชอบ (ครึ่งขวดกำลังพอดี) ปล.ตามจริงโปรกินกับพวก สไปรท์ / ชาลิปตั้น /เครื่องดื่มต่างๆ /ไอดิม จะอร่อยกว่าล็น
และเมาเหมือนกันครับ^ ^

ก๊อบเค้ามานะ อิอิ
ลองฟังดูนะ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TmDYM0ITPHo%5B%2Fyout

LEAN - ILLSLICK (เนื้อเพลง)
เพลงใหม่.. นานๆ ปล่อยของที เลยมาเร็ว เคลมเร็ว! :) - ถ้าจะคิดก๊อบเนื้อเพลง ก็ไม่ว่ากัน แต่หัดให้เครดิตคนแกะบ้าง ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกของความเป็นคนอยู่!" - ถึงจะ...
YOUTUBE.COM

Like · Comment · Share

357 people like this. Top Comments

VISITOR POSTS

[redacted]
February 7 at 10:40pm

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006480505453&fref=ufi&rc=p ระวังคนนี้ไว้นะคับผม โดนไปเกือบหมื่นตอนนี้ยังไม่ตอบเลย

Like · Comment

[redacted]
February 1 at 2:08pm

อุทัยธานี มีโปรขายไหมคับ

Like · Comment

[redacted]
January 25 at 9:43pm

หาซื้อแคปเขียวเหลือง กระปุกละ1800-2100 ใครขายอินบ๊อกมาหาผมหน่อย หรือ ราคาเท่าไรลองว่ามา

Like · Comment 1 Like

English (US) · Privacy · Terms · Cookies · Advertising · Ad Choices · More
Facebook © 2016

[redacted]
February 24, 2014 ·

ยาวๆไป^^

Like Comment Share

71 people like this. Top Comments

[redacted]
t สูตรนี้ผสมยังไงคับ ใครรู้รบกวนบอกทีจ้าอยากลองจัง^^
Like · Reply · 1 · March 30, 2014 at 11:29am

[redacted]
ต้องใช้ทามาด็อนป่าวคับ
Like · Reply · April 10, 2014 at 6:55pm

YouTube TH

Purple Green ILLSLICK ผสมLEAN Noi Lovly

[redacted]
Subscribe 172

52,301

Add to Share More 178 9

illslick lean (ผสมกินกันเล่นๆ)
น้องแท็ก คณะ หัวรุนแรง
81,096 views

สูตรผสมลีน
pawairsson kansee
208,682 views

ทดลองสูตรเย็น by ทีมงานบักส
ปุรเชษฐ สีดาดาน
52,182 views

กินดิมสูตร illslick
Kanyawat Tanotdong
408,014 views

วิธีทำ 4x100 1
Ratchakorn Stuffit
128,274 views

B: ไอซ์: สถานการณ์

แหล่งผลิตไอซ์

สามเหลี่ยมทองคำ

* นำเข้าไทยเกินกว่าร้อยละ 80

ทวีปแอฟริกาและอิหร่าน

- นำเข้าไทยร้อยละ 10-20
- การนำผ่านไปยังประเทศ อื่น ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

ราคาขายและการแพร่ระบาด

- ชายแดน : กิโลกรัม 700,000-800,000 บาท
- **พื้นที่ตอนใน**
- กทม .: กิโลกรัม 1.5-2 ล้านบาท
- รายย่อย

-1 กรัม / จี = 2,500-3,000- 0.50 กรัม = 1,500-2,000

-0.10 กรัม (ตัก)= 300-500 บาท

ปัจจัยของการแพร่ระบาด

- ออกฤทธิ์เหมือนยาบ้า ความบริสุทธิ์เกิน 80 %
- สร้างความเชื่อว่าเสพไอซ์ ผิวขาว ไม่ทรุดโทรม
- ผู้ขายวางตลาดราคาถูก นน. 0.10 กรัม (300-500 บาท) กระจายเร็ว
- ผู้ผลิตและผู้ค้าเป็นกลุ่มเดียวกับยาบ้า
- ไอซ์ มีขั้นตอนผลิตน้อย

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์ ปปส.

ยาไอซ์

น้ำแข็ง สเก็ต คริสตัลเมธ (crystal meth)
ชาบู (shabu) แคร็งค์ (krank)
ทวีค (tweak) ทิน่า (tina)

วัยรุ่นเชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะ

- **ผอม หุ่นดี ช่วยลดน้ำหนัก**
- ผิวสวย ผิวขาว
- สวยหล่อ
- ไม่มีกลิ่นตัว
- สมองดี เรียนเก่ง
- มีกำลังเยอะ **เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ**

องค์ความรู้จากงานวิจัย

เชิงวิทยาศาสตร์ของตัวยา

- มีความรุนแรนมีความรุนแรงกว่ายาบ้า(เมทแอมเฟตามีน)เป็น 4-5 เท่า --เสพแล้วติด
- เมื่อเสพจะไปทำให้เส้นเลือดหดตัว เส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงที่ผิวหนังหรือสมองจะลดลง โดยเฉพาะเลือดที่ไปเลี้ยงที่ผิวหนังจะลดลงและทำให้ผิวซีด **--ขาว--สวย??**
- เมื่อเสพจะไม่รับประทานอาหาร ทำให้เป็นโรคขาดวิตามินและแร่ธาตุสำคัญต่อร่างกาย น้ำหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัด **--ผอม --สวย??**
- ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เต้นผิดจังหวะในขณะเสพ มีภาวะตื่นตัว มีพละกำลังมากผิดปกติ **--แข็งแรง??**
- ถ้ายาขนาดเกิน จะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อเกร็งตัว ตื่นตกใจกลัว ถ้าอาการรุนแรงอาจชักหรือหมดสติ ระบบหายใจล้มเหลว ช็อกและเสียชีวิต
- เสพเป็นเวลานานจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เกิดภาวะหัวใจและสมองขาดเลือด(สมองฝ่อ)
- ระบบการทำงานของปอด ตับไต และหัวใจเสียหาย เซ็กเสื่อม อวัยวะเพศไม่แข็งตัว รูปร่างผอมแบบทรุดโทรม -- **สวย- เพิ่มสมรรถนะทางเพศ??**

องค์ความรู้จากงานวิจัย

- ♀ เสพเพราะเขาบอกว่า ผอม ขาว และจะสวย
- เสพเพราะเขาบอกว่า ♂ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

เชิงสังคมและวัฒนธรรม

- เพศหญิงเสพ-ค้ามากกว่าเพศชาย (จากยอดการบำบัดและจับกุมตั้งแต่ปี 2548)
- กลุ่มเสี่ยงเริ่มใช้ที่อายุน้อยลง
- คาดการณ์ผู้เสพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง
- ใช้เพื่อความบันเทิงทั้งชายและหญิง
- บ้างเลือกใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์
- ส่วนมากเคยใช้ยาบ้ามาก่อน / ใช้ร่วมกับยาอื่น
- ไม่สนใจคนรอบข้าง แปลกแยกจากครอบครัว มีแน้วโน้มก่อความรุนแรง(กับครอบครัว/คนรอบข้าง) และเกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ (ติดยา)
- ผู้เสพและค้ามักเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาบ้า

วัยรุ่นในสถานพินิจกับยาเสพติด: มิติวัฒนธรรมและสังคมที่เสี่ยง ๒

167 แห่งทั่วประเทศ


A
B
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เรือนจำ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บ้านเมตตา มุทิตา



ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ. เยาวชนก่ออาชญากรรมพุ่ง กพ. 2558.
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/635550

องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก

- เป็นเยาวชนเพศชายมากกว่าเพศหญิง
- มักอาศัยอยู่ในครอบครัวไม่สมบูรณ์ และปัญหาคุณภาพของครอบครัว หรือมีปัญหาครอบครัวไม่อบอุ่น
- อาชีพของสมาชิกในครอบครัว(ผู้ปกครอง)ไม่มั่นคง และรายได้ต่ำ
- ส่วนมากยังเรียนเมื่อถูกจับ หรือทำงานมีรายได้ต่ำ หรือว่างงาน <u>แต่มีรายได้จากการค้ายาเสพติดมากกว่ารายได้หลัก และมักไม่เรียนต่อ</u>
- ครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติดมาก่อน

องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก(ต่อ)

- มักมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- เยาวชนส่วนใหญ่โดนจับด้วยคดียาเสพติดมากกว่าคดีอื่น
- อายุเด็กและเยาวชนที่เข้าสถานพินิจ ตั้งแต่ สิบขวบขึ้นไป
- เมื่อถูกจับซ้ำจะมีทักษะในทางที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้น และมักถูกจับในคดีอื่นในครั้งที่สอง เช่น ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์
- ความรู้สึกเมื่อเสพยาครั้งแรกจะรู้สึกดีชอบ
- ตัดสินใจเสพครั้งแรกเพราะเพื่อน คู่รัก ชักชวน

องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก(ต่อ)

- <u>ส่วนมากคิดว่าที่เสพยาบ้า นั้นไม่ติดและสามารถเลิกได้ และมีทัศนคติเชิงบวกกับยาเสพติด</u>
- สาเหตุการค้ายาเพราะต้องการยาและเงิน (รายได้ดี) และส่วนมากมักผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อย ใน 1 ปี และส่วนหนึ่งเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งยาเสพติด
- ลูกค้าส่วนมากคือเพื่อน และคนรู้จัก มีการแนะนำต่อๆกันมา
- รายได้เป็นตัวผลักดันเด็กและเยาวชนให้ค้ายาเสพติด
- ยาบ้าเป็นตัวยานิยมสำหรับเด็กชาย และยากลุ่มยาเพื่อความบันเทิงเป็นที่นิยมของเด็กหญิง

ช่องว่างของมิติสังคมวัฒนธรรมเรื่องยาเสพติดกับเด็กและเยาวชน

- ปัจจัยภายในตัว
  - พฤติกรรมและพัฒนาการของวัยรุ่นตามวัย
  - ค่านิยม ความเชื่อ
  - แรงกระแทกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

- คน หน่วยงานรอบๆตัววัยรุ่น
  - ครอบครัว
  - เพื่อน
  - ครู(โรงเรียน)
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นอยู่
- สื่อและการเข้าถึง (ออนไลด์)
- คนทำงานที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทัศนคติ และเงื่อนไขในการทำงาน

มิติสังคมวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเสี่ยงแค่ไหน

ตัวเด็ก	การอบรมเลี้ยงดู	พฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่
ครอบครัว	เปลี่ยนแปลงไม่ใส่ใจมากขึ้น	เด็กอยู่คนเดียว
เพื่อน	ใกล้ชิด คิดเหมือนกัน	เชื่อทำตาม +-
ครู(รร.)	การแลไม่ทั่วถึง/ทัศนคติของครู	ปล่อยไม่สนใจ
คนรอบตัว	เกี่ยวพันกับความเสี่ยง/ทัศนคติเดิมๆ	ผลักและดึงให้เข้าสู่ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากปัจเจก(ตัวเอง)

- ครอบครัวไม่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงสถาบันในสังคมอื่นๆ
- พัฒนาการของช่วงวัยผลักดันพฤติกรรมการแสดงออก
- อิทธิพลคนรอบตัวและการเรียนรู้-เรียนแบบ

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

- สังคมเงินตรา
- เศรษฐกิจในครัวเรือน รายได้มากกว่ารายจ่ายไม่มากนัก
- การสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ปัญหาครัวเรือนและส่วนตัวเรื่องค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
- รูปแบบชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่อยู่ในบริโภคนิยมและเสรีนิยม
- สภาพของสถานที่อยู่อาศัยและสถานที่ไปใช้เวลา
- ค่านิยมของชุมชน-สังคม การให้ค่าและตีตราบางอย่าง
- ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อชนิดของยา/สารเสพติดที่เลือกใช้ - การเข้าถึงยา
- กระแสโลกและการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒน์ (ทำให้โลกแคบลง)

บริบทของมิติสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ปัจเจกตกเข้าสู่ปัญหายาเสพติด

คำถามต่อไป คือ

เรามีองค์ความรู้ด้านนี้มากแค่ไหน

ใครต้องดำเนินการ


DEATH
DEATH
DEATH
DEATH
DEATH
Drugs. It isn't funny.
It isn't a joke.
It could mean
your life.

ขอบคุณค่ะ